



Gravidez na adolescência

Desde 1970, tem aumentado os casos de gravidez na adolescência e diminuído a idade das adolescentes grávidas. A gravidez ocorre geralmente entre a primeira e a quinta relação sendo o parto normal a principal causa de internação de brasileiras entre 10 e 14 anos.

As principais causas da gravidez são: o desconhecimento de métodos anti-concepcionais, a educação dada a adolescente faz com que ela não queira assumir que tem uma vida sexual ativa e por isso não usa métodos ou usa outros de baixa eficiência (coito interrompido, tabelinha) porque esses não deixam "rastros". O uso de drogas e bebidas alcóolicas comprometem a contracepção, além das que engravidam para casar-se.

A adolescente tem problemas emocionais devido a mudança rápida em seu corpo ou, como ela esconde a gravidez, o atendimento pré-natal não é adequado. Podem ocorrer problemas como aborto ou dificuldade na amamentação.

	Uso de preservativo entre 16 e 25 anos	Bebidas alcóolicas antes da relação entre 16 e 25 anos
SIM	44,40%	18,80%
NÃO	55,60%	71,70%

Dados sobre a Gravidez na Adolescência

- 18% das adolescentes de 15 a 19 anos já haviam ficado grávidas alguma vez.
- 1 em 3 mulheres de 19 anos já são mães ou estão grávidas do 1º filho.
- 1 em 10 mulheres de 15 a 19 anos já tinham 2 filhos.
- 49,1% destes filhos foram indesejados.
- 20% das adolescentes residentes na zona rural tem pelo menos 1 filho.
- 13% das adolescentes residentes na área urbana tem pelo menos 1 filho.
- 54% das adolescentes sem escolaridade já haviam ficado grávidas.
- 6,4% das adolescentes com mais de 9 anos de escolaridade ou já eram mães ou estavam grávidas do 1º filho.
- 20% das adolescentes residentes na região norte tem pelo menos 1 filho.

- 9% das adolescentes residentes na região centro-oeste tem pelo menos 1 filho.
- (texto extraído da internet)